

ДИАГНОСТИКА:

01.

Анализ крови на микрофлору

02.

Бактериологический посев

03.

Иммунологическая проба крови

04.

ПИФ — метод

05.

ПЦР — исследование

ИППП-ЭТО ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, У КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВОЙ

- ИППП, переносятся от одного полового партнера другому, неинфицированному, при незащищенном половом акте в любой его форме.
- Возбудителями могут выступать вирусы, бактерии, грибки и простейшие.
- Часть инфекций поражает только половую систему, но и способны «расселяться» по всему организму и наносить непоправимый вред здоровью, поражая даже спинной и головной мозг человека.

Инфекции, передающиеся половым путем



ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

У женщин это проявляется трудностями с зачатием, поражениями плода, мертворожденными и проблемами со здоровьем у детей. Могут возникать тяжелые патологии половых органов.

У мужчин появляются нарушения потенции, бесплодие и импотенция, простатит и аденомы простаты. Часты случаи поражения мочевыводящих путей с восходящей инфекцией в почки.



Чем быстрее после возникновения первых проявлений инфекции пациент обратится к врачу, тем больше у него шансов полностью избавиться от заболевания.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ИППП

У МУЖЧИН:

- **Выделения:** гнойные с примесью крови при гонорее, слизисто-гнойные при трихомониазе и хламидиозе, слизистые при уреаплазменной, микоплазменной, вирусной инфекции, творожистые – при кандидозе.
- **Расстройства мочеиспускания** – рези, боли в начале, а затем и на протяжении мочеиспускания. Интенсивность болевых ощущений нарастает по мере распространения и углубления воспаления.

У ЖЕНЩИН:

- **Нехарактерные выделения из влагалища** . Жидкие, с неприятным запахом, однородной консистенции выделения, прилипающие к стенкам влагалища, дискомфорт. При длительно текущем процессе выделения приобретают желтовато-зеленоватую окраску.
- **Воспаление мочевого пузыря**. При нем меняется цветность и прозрачность мочи. Боли в надлобковой области не только сопровождают все мочеиспускание, но и сохраняются после него.
- **Боли в нижних отделах живота**, усиливающимися при половых контактах, а также нарушениями менструального цикла.



ПРОФИЛАКТИКА ИППП

Любое заболевание намного проще предупредить, чем вылечить. Исходя из этого, от большинства болезней, входящих в ИППП список, можно успешно защититься следующими методами:

01.

Избегать контактов с людьми из группы риска (наркоманы, алкоголики и пр.)

02.

Применение презерватива защищает от большинства инфекций

03.

Нетрадиционные формы секса можно использовать только с проверенным партнером,.

04.

Медикаментозная профилактика- применение лекарственных средств, обладающих противомикробным действием